

4 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียนกรณีจำเป็น
และ 4 ข้อปฏิบัติเฝ้าระวังและติดตามอาการ
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

- 1 มีความเสี่ยง**
อยู่ในกลุ่มคนรวมกันจำนวนมาก
พื้นที่แออัด
- 2 มีอาการแสดง**
ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
- 3 สัมผัสผู้ติดเชื้อ**
(เสี่ยงสูง : High risk contact)
- 4 เฝ้าระวัง คัดกรอง**
ตามมาตรการ
Sandbox Safety Zone in School
สำหรับโรงเรียนประจำ

หมายเหตุ

1. นักเรียน ครู บุคลากร ประเมินความเสี่ยงตนเอง ผ่าน TST
2. กรณีจำเป็นต้องตรวจ ATK เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ใช้วิธีตรวจทางน้ำลาย

4 ข้อปฏิบัติ เฝ้าระวังและติดตามอาการ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก อายุ 5-11 ปี

- 1 สังเกตอาการหลังฉีด**
อย่างน้อย 30 นาที
ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีด
- 2 สังเกตอาการที่พบบ่อย**
ไม่รุนแรง
หายได้เอง
ใน 1-2 วัน
● ปวด บวม
● รอยแดง บริเวณที่ฉีด
● ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
● ไข้ นานสั้น
● ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ
- 3 หากมี อาการรุนแรง**
ให้รีบไปพบแพทย์
หรือโทร 1669
● เจ็บแน่นหน้าอก
● หายใจหอบ เหนื่อยง่าย
● อ่อนเพลียมาก
● เป็นลมหมดสติ
- 4 งดออกกำลังกาย**
หรือทำกิจกรรมอย่างหนัก
เป็นเวลา 7 วัน